CATALOGUE DES ORTHOPTEROIDES CONSERVES DANS LES COLLECTIONS ENTOMOLOGIQUES DE L'INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE (1)

BLATTARIAE : Troisième partie : Ectobiinae et Theganopteryginae

Addendum : Blatellidae, Perisphaeridae et Pycnoscelidae

SALTATOPTERA: Gryllacridae

PAR

P. VANSCHUYTBROECK (Bruxelles)

Cette cinquième suite du catalogue des Orthoptéroïdes comprend la mise en ordre, la recherche et l'authentification des Saltatoptera Gryllacridae, qui suit celle des Gryllidae.

Cette très importante collection est basée sur divers apports de spécialistes et dons de récolteurs (Saussure, Brunner, Brisout, Bolivar, Fruhstorfer et Van Volxem).

BLATTARIAE

XX. — ECTOBIIDAE JAKOBSON & BIANKI, 1902-05

Ectobiidae Jakobson & Bianki, 1902-06, Prjamkrylyja i loznosetcatokrylyja Ross. imp., pp. 116-124.

(1) 1) Dermaptera in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 45.41.69.

Polyphagoidea et Blaberoidea in Bull. Inst., r. Sc. nat. Belg., 45, 14, 69.
 Nyctiboridae, Epilampridae et Blattellidae in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg.,

46, 20, 70.
4) Saltatoptera: Grillidae, Oecanthidae et Gryllotalpidae in Bull. Inst. r. Sc. nat. Belg., 47, 15, 71.

- (=Ectobiidae Brunner; Ectobites Saussure; Ectobinae Kirby; Ectobinae Shelford; Pseudomopinae Bruijning).
 - 1) Sous-famille des Ectobiinae CHOPARD, 1901

Ectobiinae CHOPARD, 1901, Faune de France 56, p. 13

124. — Ectobius Stephens, 1835, Illustr. brit. Ent. mandib. 6, London, p. 45.

Type du genre : Blatta laponica STEPHENS.

- 276. pallidus (OLIVIER), 1789, Encyclop. méthod. Hist. nat. 4, Paris, p. 319 (Blatta).
 (=lividus Fabric. : Blatta).
 40 exemplaires : diverses localités (det. : Burr, Finot, Brunner).
- 277. vittiventris Costa, 1847, Ann. Accad. Aspiranti natural. (2) 1, p. 111. 1 exemplaire: Voltajigio, de Bormans (det.: Brunner).
- 278. nicaeensis (Brisout), 1852, Ann. Soc. ent. Fran.
 (2), p. 68 (Blatta).
 2 exemplaires typiques: Env. Nice: Coll. Selys ex Coll. Brisout de Barneville; étiquette de détermination manuscrite: Brisout; étiquette: Type; (rev.: Brunner, Burr). SYNTYPES.
- 279. lapponicus Linné, 1758, Syst. naturae 1, ed. X, Holmiae, p. 425 (Ectobius).
 (=perspicillaris Herbst; minor Linné).
 2 exemplaires: Russie: Sarepta; Valachie: Moutoudou; Coll. Finot (det.: Finot).
- 280. sylvestris (Poda), 1761, Ins. Mus. Graecensis graecii, p. 50 (Blatta). (=hemiptera Fabric.).
 2 exemplaires: Coll. Van Volxem (det.: Brunner: Ectobia hemiptera Fabric.).
- 281. panzeri (Stephens), 1835, Ill. Brit. Ent. 6, p. 47 (Blatta).

 (=ericetorum Westm.)

 22 exemplaires: France, Suisse, Belgique: Coll. Brisout, Coll. Van Volxem, Coll. Fauvel, Coll. Pandellé (det.: Burr, Brisout, Brunner: Blatta

ericetorum WESTM.).

- 282. albicinctis (Brunner), 1861, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 11, p. 286 (Blatta).

 2 exemplaires : Coll. A. Fauvel, ex Pandellé (det. : Fauvel).
- 283. tingitanus Bolivar, 1914, Mem. Soc. esp. hist. nat. 8 (5), p. 165.
 1 exemplaire: Tanger: M. Escalera (det.: Morales 1950).
- 284. africanus Saussure, 1899, Abhandl. Senckenb. naturf. Ges. 21, p. 569 (Ectobius).
 3 exemplaires: Ruanda, 1935; Vitshumbi, 1933; Forêt Mayumbu, 2000 m, 1933: G. F. DE WITTE (det.: Hanitsch).
- 125. **Phyllodromica** Fieber, 1903, Lotos 3, p. 93. (=*Hololampra* Saussure; *Aphlebia* Brunner).

Type du genre: Blatta megerlei Fieber. (=B. punctata Charpentier).

- 285. marginata (SCHREBER), 1781, Naturforscher 15, p. 88 (Blatta).
 8 exemplaires: Sicile; Grèce: K. J. Lange, Dalmatie (det.: Brunner).
- 286. cincticollis Lucas, 1849, in : Explor. scient. Algérie, Zool. 3 (1), p. 8.

 2 exemplaires : ♂ & ♀; Oran, 15-XI-76; 16-VII-84, Coll. Finot (det. : Finot).
- 287. megerlei Fieber, 1853, Lotos 3, p. 94 (Phyllodromica).
 (=punctata Charpentier).
 2 exemplaires : Coll. Selys ex Brisout (det. : Brunner : Ectobia punctata Charp.).
- 288. maculata (Schreber), 1786, Naturforscher 15, p. 89 (Blatta).
 7 exemplaires : Dürnstein a/Donau (Nied. Ost.) Montandon (det. : Saussure : Aphlebia maculata Sch.); Allemagne; Vienne (det. : Brunner : E. maculata Sch.; rev. : Brunner).
- 126. **Arbiblatta** Снорард, 1936, Bull. Soc. Hist. nat. Afriq. Nord, Т. 23, n° 2, p. 62.
 - Type du genre : Aphlebia larrinnai Bolivar.
 - 289. larrinnai Bolivar, 1861, Ann. Soc. esp. Hist. nat. 10, p. 500 (Aphlebia).

- 4 exemplaires: Ain Leuh, 17-V-23: M. ESCALERA (det.: Morales, 1950); Oran, 15-V-85, 19-XII-1885, Coll. Finot (det.: Finot: Aphlebia larrinnai Bol.).
- 290. reticulata Chopard, 1936, Bull. Soc. Sci. nat. Maroc, 16 (2), p. 155.
 1 exemplaire: Bal Taza, Elajmas Yebala, V-1941: M. Morales (det.: Morales).
- 291. azruensis (Werner), 1929, S.B. Akad. Wiss. Wien, math.-naturw. Kl. (1) 138, p. 172 (Hololampra).
 2 exemplaires: Marruecos, Azrou, VI-1925: M. Escalera (det.: Morales, 1950).
- 292. abdelazizi (BOLIVAR), 1908, Bol. Soc. esp. Hist. nat. 8,, p. 91 (Hololampra).
 2 exemplaires: Yebel Dersa, Haus Yebala, v. 1941: E. Morales (det.; Morales).
- 293. haffidi (Bolivar), 1908, Bol. Soc. esp. Hist. nat. 8, p. 91 (Hololampra).
 1 exemplaire: l'Hdaljeb, 19-IV-25: M. Escalera (det.: Morales, 1950).
- Lobolampra HOULBERT, 1927, Thysanoures, Dermapt. Orthopt. de France, 2, p. 18.
 - Type du genre: Aphlebia algerica Bolivar.
 - 294. virgulata (Bolivar), 1878, Ann. Soc. ent. belg. XXI, p. 67 (Aphlebia).
 3 exemplaires typiques: Pedro do Cerro; Coll. C. Van Volxem; étiquette de détermination manuscrite: Bolivar; étiquette « Type ». HOLOTYPE et 2 PARATYPES.
 - 295. subaptera (RAMBUR), 1838, Faune entom. Andalousie 2, Paris, p. 14 (Blatta).

 1 exemplaire: Coll. A. FAUVEL, ex PANDELLÉ (det.: SAUSSURE).
 - 296. theyi (Chopard), 1936, Bull. Soc. Hist. nat. Afriq. Nord, 7, p. 63 (Dziriblatta).
 1 exemplaire: Bal. Ruadi, Beni Syyel, IV-1932, C. Bolivar (det.: Chopard, 1936, étiquette paratype). PARATYPE.
 - 297. cazuroi (BOLIVAR), 1885, Le Naturaliste, p. 116 (Aphlebia).

 1 exemplaire: Oran, 5-V-79, Coll. Finot (det.: Finot).

- 298. janeri (Bolivar), 1894, Anal. Soc. esp. Hist. nat. 23, Actas, p. 63 (Aphlebia). 1 exemplaire: Tanger: M. Escalera (det.: Morales).
- 299. bolivari (CHOPARD), 1936, Bull. Soc. Sci. nat. Maroc 16 (2), p. 153 (Dziriblatta).
 (=algerica BOLIVAR).
 1 exemplaire: Tanger: M. ESCALERA (det.: MoRALES, 1950).
- 128. Luridiblatta Fernandes, 1965, Arq. Mus. Bocage (2) 1, Not. Sup. p. 1. (=Lamprella Bolivar).
 - 300. trivittata (Serville), 1839, Hist. nat. Ins. Orth. Paris, p. 106 (Blatta).
 2 exemplaires: Larache: M. Escalera; Tanger (det.: Morales, 1950: Lamprella trivittata Serville).
 - 2) Sous-famille des Theganopteryginae Princis, 1955.

Theganopteryginae Princis, 1955, Ann. Mus. Congo Tervueren, Ser. in 8°, Zool. 40, p. 40.

- 129. Theganopterix Brunner, 1865, Nouv. Syst. Blatt. Wien, p. 53.
 Type du genre: Ectobia lucida Brunner.
 - 301. nitida Borg, 1902, Bihang. Sv. Vet. Akad. Handl. 28, Afd. 40, n° 10, p. 4.

 1 exemplaire : Kinschassa : Waelbroeck, 13-X-1896 (det. : Shelford, 1908).
 - 302. bananae Shelford, 1908, Mém. Soc. ent. belg. 15, p. 227 (Theganopterix).
 4 exemplaires typiques: Banane: E. Busschodts; étiquette de détermination manuscrite de Shelford; étiquette « Type ». HOLOTYPE et 3 PARATYPES.
 - 303. lucida Brunner, 1865, Nouv. Syst. Blatt. Wien, p. 62 (Theganopterix).

 1 exemplaire: Congo: Kaziba, 18-26-XI-1948: G. F. de Witte (det.: Jolivet).
 - 304. congoensis Shelford, 1908, Mém. Soc. ent. belg. 15, p. 207 (Theganopterix).

 2 exemplaires : ♂ et ♀; Loango : Waelbroeck; étiquette de détermination manuscrite Shelford; étiquette « Type » : Theganopterix congoensis n. sp. HOLOTYPE ♂ et PARATYPE ♀.

130. - Aristiger Hebard, 1940, Ent. News, 51, p. 139.

Type du genre: Thyrsocera histrio Burmeister.

- 305 histrio (Burmeister), 1838, Handb. Ent. 2 (2), Berlin, p. 499 (Thyrsocera).
 (=inversa Brunner).
 4 exemplaires: Java (det.: Brunner: Blatta inversa Brunn.) Java, 2000', 1892-93: Fruhstorfer (det.: Brunner).
- 131. Hemithyrsocera Saussure, 1893, Soc. Ent. 8, p. 57. (=Mopserina Princis).

Type du genre: Blatta palliata FABRICIUS.

- 306. palliata (Fabricius), 1798, Suppl. Ent. Syst. Hofniae, p. 186 (Blatta).
 1 exemplaire: Sumatra: Aer Poeti, 23-IV-1929: Prince Léopold (det.: Hanitsch, 1930).
- 307. major (Brunner), 1893, Ann. Mus. Civ. Genova,
 33, p. 22 (Thyrsocera).
 1 exemplaire: Calcutta, 89 (det.: Saussure: Hemithyrsocera major Brunner).
- Burchellia RHEN, 1932, Proc. Acad. nat. Sci. Philadelphie 84, p. 414.
 - Type du genre : Blatta circumcincta Reiche et Fair-MAIRE.
 - 307. vinula (Stal), 1856, Ofv. Sv. Vet. Akad. Förhandl.
 13, p. 166 (Blatta).
 42 exemplaires: Rhodésie du Nord; Congo; Afriq. Centrale; Kenya: Brédo, Cooreman, Vrydagh, Mertens, Coll. Candèze, Coll. Nonfriend (det.: Shelford, 1908, partim).

ADDENDUM

XIX - BLATTELLIDAE KARNY, 1908

133. — Euthastoblatta Hebard, 1917, Mem. Amer. ent. Soc. 2, p. 26. (=Aglaopterix Hebard).

Type du genre: Anaplecta abortiva CAUDELL.

- 310. orizabae (Saussure), 1868, Rev. Mag. Zool. (2) 20, p. 355 (Blatta).

 1 exemplaire: Cayenne: F. Pillault (det.: Saussure: Phyllodromia orizabae Saussure).
- 134. Cariblatta Hebard, 1916, Trans. Amer. ent. Soc. 42, p. 147.

Type du genre: Blatta delicatula Guérin. (=B. Punctulata BEAUV.).

311. — delicatula (Guérin), 1857, in : Sagra 6, Insect. (Blatta). (=punctulata Beauv.).

1 exemplaire : Antigoa, Eté 72 (det. : Saussure).

135. — Luparia Walker, 1868, Cat. Blatt. Brit. Mus. London, p. 65. (= Onychostylus Bolivar; Eoblatta Shelford; Graptoblatta Hebard; Euryblatta Chopard).

Type du genre : Luparia adimonialis WALKER.

312. — notulata (STAL), 1858, Eugenies Resa Zool. (p. 308 (Blatta).

(= hieroglyphica Brunner).

1 exemplaire: Java: Fruhstorfer (det.: Saussure: Phyllodromia hieroglyphica Brunner).

VIII. - PERIPHAERIIDAE BRUES et MELANDER, 1932

- 38. Perisphaeria Burmeister 1838.
 - 308. saxicola (Eschscholz), 1822, Entomographien, Erste Lief, Berlin, p. 89 (Blatta).

 (=granicollis Burmeister).

 1 exemplaire: sans localité (det.: Saussure).

IX. - PYCNOSCELIDAE PRINCIS, 1960

- 47. Stilpnoblatta Saussure et Zehntner, 1895.
 - 309. Stilpnoblatta malaya Hebard, 1929, Pr. Ac. nat. Sci. Philadelphie 81, pp. 15-104.

 1 exemplaire: Java: Fruhstorfer (det.: Saussure).

SALTATOPTERA

Super-famille des GRYLLACRIDAE

I. - Famille des STENOPELMATIDAE

- Sous-famille des Stenopelmatinae Karny, 1928.
 Stenopelmatinae Karny, 1928, Entom. Mitt. Berlin, vol. 17, p. 225.
 Sous-famille peu conséquente, groupant 5 genres confinés le long des côtes du Pacifique, de l'Est de l'Asie et de l'Afrique du Sud.
 - Sia Giebel, 1861.
 Sia Giebel, 1861, Zeitschr. Ges. Naturw. vol. 18, p. 116.
 (=Licola Walker, 1864; Bugajus Brunner, 1888).
 - ferox Giebel, 1861, Zeitschr. Ges. Naturw. vol. 18, p. 116.
 (=couloni Walker; grandis Samoulle).
 1 exemplaire: sans localité n° 358 (det.: Brunner: probablement de Java couloni Walker).
- 2) Sous-famille des Henicinae KARNY, 1928.
 Henicinae KARNY, 1928. Entom. Mitt. Berlin, vol. 17, pp. 224-225.
 Sous-famille comptant des genres uniquement dans les régions tropicales; très nombreux genres, dont un seul en collection : Aïstus BRUNNER.
 - 2. Aïstus Brunner von Wattenwyl, 1888.

 Aïstus Brunner, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, pp. 254-278.

Type du genre: Aïtus gracilis Brunner.

- gracilis Brunner, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, p. 278.
 4 exemplaires: Nouvelle-Calédonie (det.: Brunner).
- Sous-famille des Deinacridinae, KARNY, 1932.
 Deinacridinae KARNY, 1932, Zool. Anz., vol. 97, pp. 141-143.

(=Anostostominae KARNY).

Petite sous-famille cantonnée au Chili, Nouvelle-Zélande et Australie.

3. — Hemideina WALKER, 1869, Cat. Der. Salt, Brit Mus. vol. I, p. 1160.

Type du genre : Hemideina capitolina WALKER.

thoracica White, 1846, Voy. Erebus et Terror,, vol. 2, Ins. p. 25.
 exemplaire: Wellington, Nouvelle-Zélande: Stephenson (det.: Brunner: Deinacrida thoracica White).

4. - Deinacrida WHITE, 1842.

Deinacrida WHITE, 1842, Gray's Zool. Misc., p. 78.

Type du genre: Deinacrida heteracantha WHITE.

rugosa Buller, 1871, Trans. N. Zeal. Inst., vol. 3, p. 36.
 exemplaires: Neu Seeland: Capity Island.

II. - Famille des GRYLLACRIDAE

5. — Hadrogryllacris Karny, 1937.

Hadrogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 69.

Type du genre: Gryllacris magnifica Brunner.

 uniguttata Walker, 1869, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., vol. 1, p. 183 (Gryllacris).
 exemplaire: Australie; M.R. Belg. (det.: Brunner: P. lobata Brunner.

6. - Paragryllacris Brunner, 1888.

Paragryllacris Brunner, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, pp. 316-369.

Type du genre: Gryllacris combusta Gerstaecker.

6. — combusta Gerstaecker, 1860, Arch. f. Naturg., vol. 26, p. 267.
 2 exemplaires: sans localité; M.R. Belg. (det.: Brunner: P. combusta).

7. - Craspedogryllacris KARNY, 1937.

Craspedogryllacris Karny, 1937, General Insectorum, fasc. 206, p. 76.

Type du genre : Gryllacris marginalis WALKER.

marginalis Walker, 1871, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., vol. 5, p. 20 (Gryllacris).
 (=infuscata Brunner: Paragryllacris).
 4 exemplaires: Amboine; Suyckerbuyk; M.R. Belg. (det.: Karny, 1927).

8. - Asarcogryllacris KARNY, 1937.

Asarcogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 120.

Type du genre: Gryllacris macilenta Pictet et Saussure.

pallidula Serville, 1839, Hist. nat. Ins. Orth., p. 395.
 exemplaire: Java (det.: Karny: Gryllacris pallidula Serville).

7a. - Papuogryllacris Griffini, 1909.

Papuogryllacris Griffini, 1909, Zool. Jahrb. Abt. Syst., vol. 28, pp. 139-154.

Type du genre: Gryllacris gestri Griffini.

leeuweni Karny, 1930, Nova Guinea, vol. 15, Zool. 4, pp. 386-388.
 exemplaire: Nouvelle-Guinée, 12-III-1929; Prince Léopold (det.: Willemse).

9. - Hyperbeamus Brunner von Wattenwyl, 1888.

Hyperbeamus Brunner von Wattenwyl, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, p. 316, 367.

Type du genre : Huperbeamus ensifer Brunner von Wattenwyl.

ensifer Brunner V. W., 1888, Verh. Zool-Bot. Ges. Wien, vol. 38, p. 368.
 exemplaire: Bahia, de Lacerda; M.R. Belg. (det.: Brunner V. W.).

Diaphanogryllacris Karny, 1937.

Diaphanogryllacris Karny, 1937, General Insectorum, fasc. 206, p. 100.

Type du genre: Gryllacris translucens Serville.

10. — tibialis Serville, 1839, Hist. nat. Ins. Orth., p. 393 (Gryllacris).

1 exemplaire: Java, Fruhstorfer, 219 (det.): Brunner v. W.: Gryllacris tibialis (Serville).

tranlucens Serville, 1839, Hist. nat. Ins. Orth., p. 394 (Gryllacris).
 (=amplipennis Gerstaecker, 1860 : Gryllacris).
 4 exemplaires : Amboine, Suyckerbuyk; Java : Fruhstorfer; Preanger : P. Vermersch (det. : Brunner v. W. : Gryllacris amplipennis Gerstaecker = phyganoïdes Haan).

12. — translucens var. weyersi Griffini, 1909, Atti. Soc. Ital. Sci. nat., vol. 47, p. 178.
 1 exemplaire : ♂; Sumatra, Indrapoera; Weyers; exemplaire typique : étiquette de détermination manuscrite de Griffini; étiquette « Type » HOLOTYPE.

11. - Afrogryllacris Karny, 1937.

Afrogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 108.

Type du genre: Gryllacris africana Brunner v. W.

africana Brunner v. W., 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, p. 325 (Gryllacris).
 6 exemplaires: Mukondge Farm (det.: Griffini, 1908: Gryllacris africana Brunner).

14. — büttneri Griffini, 1908, Spec. afr. Gryllacr. Siena, pp. 10-13 (Gryllacris).
1 exemplaire: Ubangi: Libengei; Leboutte, 22-VI-1900 (det.: Griffini).

brighella Griffini, 1908, Mém. Soc. ent. belg., vol. 15, p. 22 (Gryllacris).
 exemplaire: φ; Afriq. occ. équat. : Loagna; Lucas; étiquette de détermination manuscrite : Griffini, 1908; étiquette « Type » HOLOTYPE.

12. - Glomeremus Karny, 1937.

Glomeremus Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 114. Type du genre: Gryllacris glomerina Gestaecker.

16. — brevifalcatus Brunner v. W., 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, pp. 375-379 (Eremus). 1 exemplaire: Forêt de Banghi; J. Carradot (det.: Brunner v. W.: Eremus brevifalcatus Brunner).

13. - Capnogryllacris KARNY, 1937.

Capnogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 123.

Type du genre : Gryllacris fumigata DE HAAN.

17. — fumigata DE HAAN, 1842, Temminck's Verhandel. Orthop., p. 177 (Locusta).
(= nigripennis Gerstaecker).
4 exemplaires: Java: Malana; Wiederhold (det.: Brunner v. W.: Gryllacris fumigata); Java; M.R.

Brunner v. W.: *Gryllacris fumigata*); Java; M.R. Belg. (det.: Brunner: *Gryllacris nigripennis* Gerstaecker).

14. - Barombogryllacris Karny, 1937.

Barombogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 127.

Type du genre: Gryllacris barombica KARSCH.

nigriceps Karsch, 1891, Berl. Ent. Zeitschr., vol. 36, p. 341 (Gryllacris) φ.
 L'exemplaire φ a été redécrit par Griffini en 1908; cfr. Mém. Soc. ent. Belg. XV, p. 21, 1908, sur un exemplaire φ, qui en a fait un PLESIOTYPE.
 1 exemplaire : Mukondje Farm — Kameroun; R. Rhode (rev. Griffini, 1908 : Gryllacris nigriceps Karsch).

15. - Niphetogryllacris KARNY, 1937.

Niphetogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 128.

Type du genre : Gryllacris niveiformis KARNY.

19. — submutica Brunner v. W., 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, pp. 326-366 (Gryllacris).

2 exemplaires: ♂ et ♀: Popocabaca, F. Loos (det. et rev. Griffini, 1908).

L'exemplaire type décrit par Brunner sur un exemplaire unique: HOLOTYPE; la ♀ a été décrite par Griffini en 1908: PLESIOTYPE. cfr. Mém. Soc. ent. belg., vol. XV, p. 29.

16. - Aphanogryllacris KARNY, 1937.

Aphanogryllacris KARNY, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 138.

Type du genre: Gryllacris inconspicua Brunner.

inconspicua Brunner, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, pp. 320-342 (Gryllacris).
 exemplaire: Equador, 71, E. DE VILLE (det.: Brunner, 1908).

17. - Eugryllacris Karny, 1937.

Eugryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 151 Type du genre: Gryllacris ruficeps Serville.

ruficeps Serville, 1831, Ann. Sci. nat., vol. 22, p. 139 (Gryllacris).
 exemplaires: Préanger-Tijnangrang; P. Vermersch; M.R. Belg. (det.: Brunner: Gryllacris ruficeps Serv.); Préanger Sumegang; P. Vermersch (det.: Griffini).

18. - Prosopogryllacris KARNY, 1937.

Prosopogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 154.

Type du genre : Gryllacris personata SERVILLE.

22. — personata Serville, 1831, Ann. Soc. Sci. nat., vol. 22, pp. 139-140 (Gryllacris).

(=falcata Brunner v. W.).

4 exemplaires Amboine; Suyckerbuyk; M.R. Belg. (det.: Brunner: Gryllacris); Java: Malang; Wiederhold (det.: Brunner: Gryllacris falcata Brunner); Préanger: Waespada; M.R. Belg. (det.: Brunner: G. falcata).

19. - Brachybaenus KARNY, 1937.

Brachybaenus Karny, 1937, Genera Insectorum fasc. 206, p. 86. Type du genre: Gryllacris longstaffi Griffini.

23. — roseiceps Ander, 1936, Opuscula Entom., vol. 1, pp. 13-14.
1 exemplaire: Colombie: Cali; étiquette de détermination manuscrite: K. Ander, 1936: Gryllacris roseiceps n. sp., « Typus »; R.M. Belg.; I.G. 15.961. HOLOTYPE.

20. - Stictogryllacris KARNY, 1937.

Stictogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 111.

Type du genre: Gryllacris punctata Brunner v. W.

24. — picteti Kirby, 1906, Syn. Cat. Orthopt., vol. 2, p. 141 (Gryllacris).

1 exemplaire: Congo; Cambier (det.: Griffini, 1908: Gryllacris picteti Kirby, ♀).

21. - Xanthogryllacris KARNY, 1937.

Xanthogryllacris KARNY, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 157.

Type du genre : Gryllacris aurantiaca Brunner.

25. — punctipennis Walker, 1869, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., vol. 1, p. 172 (Gryllacris).

(=aurantiaca Brunner).

3 exemplaires: Amboine; M.R. Belg.; Suyckerbuyk (det.: Brunner, 1908; Gryllacris aurantiaca Brunner); étiquette de détermination manuscrite de Brunner; étiquette Type. SYNTYPE; Indes Néerlandaises; Suyckerbuyk (det.: Brunner: Gryllacris aurantiaca).

25a. — giulianetti Griffini, 1909, Boll. Lab. Zool. Portici, vol. 3, pp. 208 (Gryllacris).
1 exemplaire: Nouvelle-Guinée: Noemi, 5-III-1929; Prince Léopold (det.: Chopard, 1930).

22. - Brachytheisogryllacris KARNY, 1937.

Brachytheisogryllacris KARNY, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 143.

Type du genre: Gryllacris abbreviata Brunner.

26. — abbreviata var. evolutior (Griffini (Gryllacris).

1 exemplaire: Koda Khanal (det.: Brunner:
Gryllacris abbreviata var. evolutior Griffini).

23. - Gryllacris Serville, 1831.

Gryllacris Serville, 1831, Ann. Sci. nat., vol. 22, p. 138.

Type du genre: Gryllacris maculicollis Serville. (= signifera Stoll).

- 27. jacobsoni Karny, 1924, Treubia, vol. 5, pp. 211-223.
 2 exemplaires: Sumatra: Lebrun (det.: Chopard, 1930).
- 27a. fuscifrons Gerstaecker, 1860, Arch. f. Naturg., vol. 26, pp. 256-257.
 11 exemplaires: Java, Fruhstorfer (det.: Brunner: Gryllacris fuscifrons Gerst.); Java Occid. Sukabumi, 2000, 1893, Fruhstorfer (det.: De Saussure, 1897); Java Occid. Pendalendam, 1893, Fruhstorfer (det.: De Saussure, 1897); Java, volcan Gede, II-1893, Coll. Finot (det.: Finot).

28. — nigrilabis Gerstaecker, 1860, Arch. f. Naturg., vol. 26, pp. 262-263.

2 exemplaires: Mont Mulu, 1894 (det.: Griffini: Gryllacris nigrilabis Gerstaecker); Amboine, Suyckerbuyk, M.R. Belg. (det.: Brunner v. W.: G. nigrilabis Gerst.).

29. — obscura Brunner, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, pp. 323-353.

1 exemplaire: Sumatra: Roy. de Deli, Roelofs (det.: Brunner: Gryllacris athleta Brunner; det.: Griffini: Gryllacris obcura var. sumatrana).

30. — signifera Stoll, 1813, Spectres Saut., vol. 3, p. 26 (Gryllus, Tettigonia).

(=maculicollis Serville).

11 exemplaires: Preanger Tijnangrang; P. vermersch (det.: Brunner: Gryllacris maculicollis Serv.); Indes néerlandaises; Suyckerbuyk, M. R. Belg. (det.: Brunner: G. maculicollis (Serv.); Amboine; Suyckerbuyk (det.: Brunner G. maculicollis Serv.); Pontianak, VIII-86, Bollen (det.: Brunner: G. maculicollis: Gryllacris signifera Stoll).

31. — discoidalis Walker, 1869, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., vol. 1, p. 174 (Gryllacris).
(=variabilis Redtenbacker).
2 exemplaires: Indes néerlandaises; Suyckerbuyk (det.: Brunner).

24. - Pardogryllacris KARNY, 1937.

Pardogryllacris Karny, 1937, Genera Insectorum, fasc. 206, p. 169.

Type du genre: Gryllacris pardalina GERSTAECKER.

32. — lineolata Serville, 1839, Hist. nat. Ins. Orth., p. 396 (Gryllacris).
2 exemplaires: sans localité; M. R. Belg. (det.: DE SAUSSURE: Gryllacris lineolata HAAN).

25. - Caustogryllacris KARNY, 1937.

Caustogryllacris Karny, 1937, General Insectorum, fasc. 206, p. 172.

Type du genre: Gryllacris podocausta DE HAAN.

33. — podocausta De Haan, 1842, Temminck Verh. Orth., p. 177, pp. 219-220 (Locusia Gryllacris).

2 exemplaires : Java; M. R. Belg. (det. : Brunner : sp. n.; det. : Griffini : Gryllacris podocausta De Haan); Java; Fruhstorfer (det. : Brunner et Griffini : Gryllacris podocausta De Haan).

34. — podocausta var. mutabilis Pictet et Saussure, 1891, Bull. Soc. Ent. Suisse, vol. 8, pp. 307-309.
2 exemplaires: Java; Fruhstorfer (det.: Griffini: Gryllacris podocausta var. mutabilis Pictet et Saussure).

genualis Walker, 1869, Cat. Derm. Salt. Brit. Mus., vol. 1, p. 179 (Gryllacris).
 (=nigroscutata Brunner).

1 exemplaire : Préanger Tijnangrang; P. Vermersch (det. : Brunner : *Gryllacris nigroscutata* Brunner, n. sp.; étiquette de détermination manuscrite et étiquette « Type ». SYNTYPE.

III. - Famille des RHAPHIDOPHORIDAE

A. - Sous-famille Rhaphidophorinae

26. - Rhaphidophora SERVILLE, 1839.

Rhaphidophora Serville, 1839, Hist. nat. Ins. Orth., p. 389.

Type du genre: Rhaphidophora picea Serville.

Joricata Burmeister, 1838, Handb. Ent., vol. 2, p. 722 (Phalangopsis).
 exemplaire: Préanger, Waespada, P. Vermersch, M. R. Belg. (det.: Brunner: Rhaphidophora picea Serv.; rev.: Rhaphidophora brunneri Kirby).

27. - Diestrammena Brunner, 1888.

Diestremmena Brunner, 1888, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, vol. 38, p. 298.

Type du genre: Locusta (Rhaphidophorus) marmorata De Haan.

japonica Blatchley, 1920, Orth. N. E. Amer.,
 p. 611.

(=marmorata DE HAAN).

2 exemplaires : Tonkin (?) : Than Mai, Juni-Juli; H. Fruhstorfer; don H. Fruhstorfer (det. : Brunner : Diestrammena marmorata De Haan).

28. - Stonychophora Karny, 1937.

Stonychophora KARNY, 1937, Konowia, vol. 13, pp. 73-75.

Type du genre: Rhaphidophora fulva Brunner.

37. — salomonensis Willemse, 1942. 1 exemplaire : Ile Bougainville, Salomons (det. : Ebner, 1948).

B. - Sous-famille Troglophilinae

29. - Troglophilus Krauss, 1878.

Troglophilus Krauss, 1878, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien, vol. 78, p. 535.

Type du genre: Locusta cavicola KOLLAR.

28. — cavicola Kollar, 1833, Beitr. Landeskunde Oesterr., vol. 3, p. 80 (Locusta).
 1 exemplaire: sans localité (det.: DE Saussure: Troglophilus cavicola Kollar).

C. - Sous-famille Dolichopodinae

30. - Dolichopoda Bolivar, 1880.

Dolichopoda Bolivar, 1880, Ann. Soc. ent. France (5), vol. 10, p. 72.

(=Phalangopsis Burmeister; Chopardina Uvarov).

Type du genre: Locusta palpata Sulzer.

40. — palpata Sulzer, 1776, Gesch. Ins., p. 83 (Gryllus palpatus).
9 exemplaires : sans localité; Coll. Selys (det. : Brunner : Rhaphidophora palpata (Sulzer); rev. : Burr, 1908 : Dolichopoda palpata Sulzer).

IV. - Famille des SCHIZODACTYLIDAE

Famille groupant 4 à 5 genres aptères ou à ailles très longues et enroulées à l'apex. Asie orientale et Afrique du Sud.

31. – Schizodactylus Brullé, 1835.

Schizodactylus Brullé, 1835, Hist. nat. Ins., vol. 9, p. 161.

Type du genre: Gryllus (Acheta) monstrosus Dury. (=Acheta Fabricius).

monstrosus Drury, 1773, Illustr. Exot. Ent., vol. 2,
 p. 81 (Gryllus Acheta)
 18 exemplaires: Ajmer, Rajputana (Inde), 1893 (det.: De Saussure).

INSTITUT ROYAL DES SCIENCES NATURELLES DE BELGIQUE.



